журнал №2(10) літо 2016

www.aldenvet.ua

# АЛДЕН-ВЕТ РЕВЮ

ВІДКРИВАЙ ЛІТНІЙ СЕЗОН РАЗОМ З ВЦ АЛДЕН-ВЕТ!

**У літньому номері:** Тепловий удар / Хвороби міжхребцевого диска / Якщо ваш собака любить купатися / ТОП-5 літніх небезпек для домашніх тварин / Методи ультразвукової санації ротової порожнини тварин




ЗАВАНТАЖУЙ
ALDEN CLUB
НА СВІЙ МОБІЛЬНИЙ
ТА ЗАОЩАДЖУЙ РАЗОМ З НАМИ

ШУКАЙТЕ «АЛДЕН КЛУБ» У:

Якщо у вас інший телефон, перейдіть у мобільному за посиланням:
MKARTA.COM/3961

# 7 ФАКТОВ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАЦИОНОВ ROYAL CANIN ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

*Как глобальный эксперт в области здорового питания кошек и собак,* ***Royal Canin*** *поддерживает высокое качество жизни домашних питомцев, опираясь на научные исследования и инновации. Каждая разработка компании призвана наиболее точно удовлетворить потребности животного в зависимости от породы, размера, возраста, образа жизни и физиологических особенностей. Как же производятся рационы* ***Royal Canin****?*

## Коты и собаки прежде всего

Здоровое питание можно создать, только обладая знаниями об истинных потребностях собак и кошек. Эти знания **Royal Canin** получает благодаря кропотливой работе: глубоким научным исследованиям и непосредственным наблюдениям за животными. Разработка новых рационов от идеи и до начала производства может занять у специалистов **Royal Canin** от 8 месяцев до 10 лет. Почему так долго? Потому что каждый рацион **Royal Canin** – это сложный пазл, точная комбинация свыше 50 нутриентов – таких как протеины, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, подобранных для удовлетворения конкретных потребностей организма кошки или собаки.

## 12 заводов – 1 модель

Сегодня сухие рационы **Royal Canin** изготавливаются на 12 заводах на 4 континентах. При этом заводы во всех странах – от Польши и до Канады – гарантируют идентичное **высокое качество продукции** для собак и кошек во всем мире. Это стало возможным благодаря единой формуле и рецептуре рационов, единой модели заводов и схеме технологического процесса.

## Тотальный контроль

**Royal Canin** контролирует качество на всех этапах – начиная с поиска поставщиков сырья и до упаковки готового рациона. И даже когда продукция покидает завод, управление качеством продолжается, ведь **Royal Canin** осуществляет контроль доставок и поддерживает постоянный диалог с владельцами домашних животных.

0 800 21 00 01
БЕСПЛАТНО СО СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ УКРАИНЫ
ПН-ПТ 9:00 - 18:00 • e-mail: info.ua@royalcanin.com
www.royalcanin.com.ua

ROYAL CANIN

## Тщательная проверка 100% сырья

Используя для производства сырье из разных стран, **Royal Canin предъявляет к нему единые требования**, чтобы точно воспроизвести формулу рациона. Доставлять сырье могут только проверенные поставщики, которые прошли процедуру строгого отбора. Но на этом контроль не заканчивается: в лабораториях тестируется каждая партия сырья, которая поступает на завод. В день совершается более 100 тестов, чтобы убедиться, что будут использованы только **безопасные и высококачественные источники нутриентов**.

## Высокие стандарты качества и безопасности на производстве

На всех заводах **Royal Canin** соблюдаются высокие стандарты управления качеством и контроля безопасности пищевых продуктов. Это подтверждают сертификаты на соответствие **международным стандартам ISO 9001 и ISO 22 000**. Более того, готовая продукция также проходит дополнительные анализы: с каждой партии готовых рационов отбирают пробы для полного исследования.

## Рационы Royal Canin в Украине – только отменное качество

**Royal Canin** продает в Украине продукцию, которая производится в Европе. В частности, компания завозит сухие рационы, произведённые на заводах во Франции (г. Эмарг) и Польше (г. Неполомице). Поскольку все заводы по производству сухих рационов имеют единую модель, **Royal Canin может гарантировать идентичное высокое качество своей продукции.**

## Завод Royal Canin в Польше – среди лучших

***Завод Royal Canin в Польше*** *(г. Неполомице) начал работу в 2008 году. В 2015 году завод во второй раз получил награду* ***"Excellence"*** *в рамках аудита, проведенного международной компанией LRQA. Эта награда говорит о том, что технологии завода в области контроля качества и безопасности не только* ***соответствуют международным стандартам, но и значительно превосходят их.*** *Сегодня этот завод поставляет продукцию в 17 стран мира, в том числе в Германию, Нидерланды, Швецию, Украину и даже Японию.* ***Таким образом, научный подход, единые стандарты и тщательный контроль на всех этапах – это основные принципы производства продукции компании. В результате Royal Canin уже более 45 лет обеспечивает поддержание здоровья кошек и собак по всему миру, предлагая рационы неизменно высокого качества.***

ROYAL CANIN

0 800 21 00 01
БЕСПЛАТНО СО СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ УКРАИНЫ
ПН-ПТ 9:00 - 18:00 • e-mail: info.ua@royalcanin.com
www.royalcanin.com.ua

ROYAL CANIN®

VETERINARY EXCLUSIVE

# КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

**OBESITY MANAGEMENT**

Полнорационный диетический корм для собак при ожирении (стадия 1).

Фасовка
Сухой корм: 1,5 и 13 кг
Влажный корм: 410 г

**WEIGHT CONTROL**

Полнорационный корм для взрослых собак при ожирении (стадия 2).

Фасовка
Сухой корм: 1,5 и 14 кг

**OBESITY MANAGEMENT**

Полнорационный диетический корм для котов, рекомендованный для снижения веса при ожирении (стадия 1).

Фасовка
Сухой корм: 0,4 и 1,5 кг
Влажный корм: 100 г

# ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

**RENAL**

Полнорационный диетический корм для собак, рекомендованный для поддержания функции почек при острой или хронической почечной недостаточности.

Фасовка
Сухой корм: 2 и 14 кг
Влажный корм: 280 и 420 г

**RENAL**

Полнорационный диетический корм для котов, рекомендованный для поддержания функции почек при острой или хронической почечной недостаточности.

Фасовка
Сухой корм: 0,5, 2 и 4 кг
Влажный корм: 100 г



# ЗАБОЛЕВАНИЯ НИЖНЕГО ОТДЕЛА МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

**URINARY S/O**

Полнорационный диетический корм для собак, способствующий растворению струвитных конкрементов и предотвращению их повторного образования благодаря своей способности подкислять мочу, низкому содержанию магния и протеинов высокого качества.

Фасовка
Сухой корм: 2 и 14 кг
Влажный корм: 280 и 420 г

**URINARY S/O**

**URINARY S/O HIGH DILUTION**

Полнорационный диетический корм для котов, способствующий растворению струвитных конкрементов и предотвращению их повторного образования благодаря своей способности подкислять мочу и низкому содержанию магния.

Фасовка URINARY S/O
Сухой корм: 0,4, 1,5, 3,5 и 4 кг
Влажный корм: 100 г

Фасовка URINARY HIGH DILUTION
Сухой корм: 0,4, 1,5, и 4 кг

# САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

**DIABETIC**

Полнорационный диетический корм для котов, который регулирует уровень глюкозы при сахарном диабете.

Фасовка
Сухой корм: 0,4 и 1,5 кг
Влажный корм: 100 г

VETERINARY

0 800 21 00 01
БЕСПЛАТНО ПО УКРАИНЕ ТЕЛЕФОНАМ УКРАИНЫ
www.royalcanin.com.ua

# СЛОВО РЕДАКТОРА

ЧЕРВЕНЬ 2016 РОКУ

МЕРЕЖА ВЕТЕРИНАРНИХ ЦЕНТРІВ "АЛДЕН-ВЕТ" У ЧЕРВНІ 2016 РОКУ СВЯТКУЄ СВОЇ 16 РОКІВ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ. ЗА ЦЕЙ ЧАС МИ ВСТИГЛИ ЗДОБУТИ ПОВАГУ ПАРТНЕРІВ, ДОВІРУ КЛІЄНТІВ ТА ЛЮБОВ ВАШИХ ЧОТИРИЛАПИХ УЛЮБЛЕНЦІВ. ДЛЯ НАС Є НЕЙМОВІРНО ВАЖЛИВИМ НЕ ТІЛЬКИ ПІДТРИМУВАТИ РОБОТУ НАШОЇ КОМПАНІЇ, АЛЕ І ЗРОСТАТИ ЗАДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНЮ КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ НАШИХ ПАЦІЄНТІВ.

Велика родина ВЦ «Алден-Вет» нараховує більш ніж 250 кваліфікованих спеціалістів, команду вузькопрофільних фахівців та потужний штат молодих ветеринарних лікарів, які впевнено крокують до великого майбутнього у світі ветеринарії. Завдяки цілодобовій роботі наших діагностичних та лабораторних центрів ми в змозі надавати своїм клієнтам швидку та якісну ветеринарну допомогу. Насамперед, варто відмітити суто європейський підхід до становлення та процесу роботи. Наші клініки працюють на сучасному обладнанні та тільки з перевіреними постачальниками. Усі засоби та лікувальні препарати є ліцензованими та сертифікованими за всіма міжнародними стандартами.

Цієї весни декілька наших клінік святкували свої перші ювілеї, та ми дійсно вражені, як швидко спливає час, як багато зроблено та скільки ще нового чекає нас попереду. Сил та наснаги нашій команді надають засновники ВЦ «Алден-Вет» Тищенко Денис Геннадійович та Бондаренко Алла Віталіївна. Запорука нашого успіху — їх працьовитість та бажання йти вперед. Тому тільки так і тільки разом!

У нашій мережі існує багато наукових і творчих проектів, де реалізовується безліч ідей щодо кращого функціонування ветеринарних послуг в Україні та за її межами. Це школа загальної ветеринарної практики, що створена для здобуття досвіду молодих спеціалістів. Це Всеукраїнська гільдія ветеринарів — для впливу на законопроекти та покращення умов праці в Україні. Це і періодичні видання, що створюються нашими лікарями для спілкування з клієнтами, надання необхідних порад та важливої, актуальної до сезону інформації.

Приєднуйтеся до нашої команди та ставайте частиною великої родини ВЦ «Алден-Вет».

*З любов`ю, Єфанова Леся*


ЖУРНАЛ
«АЛДЕН-ВЕТ РЕВЮ»
ЛІТО # 2(10) 2016

ЗАСНОВНИК:
ТОВ «Алден-Вет»

ДИРЕКТОР:
Тищенко Д.Г.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Єфанова Л.І.

Періодичність - 1 раз на 3 місяці. Розповсюджується бескоштовно. Зареєстровано в Державній Реєстраційній службі України, Серія КВ № 20512-10312Р від 17.01.2014р Точка зору авторів може не співпадати з позицією видавця та редакції. Засновник, видавець не несе відповідальності за зміст реклами та рекламних матеріалів.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ТА ВИДАВЦЯ:
04116, м.Київ,
вул. Артема, 10, оф. 28.
e-mail: aldenvet.pr@gmail.com
тел.: +38(044)272 07 45
www.aldenvet.ua

ЖУРНАЛ НАДРУКОВАНО
В ТИПОГРАФІЇ
«СОФІЯ А»
АДРЕСА ТИПОГРАФІЇ:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 25А
04119
Загальний наклад 5000 екз.



# ВИПАДІННЯ ЗАЛОЗИ ТРЕТЬОЇ ПОВІКИ АБО АДЕНОМА ТРЕТЬОЇ ПОВІКИ - МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД МОЄЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МЕНІ НЕОДНОРАЗОВО ДОВОДИЛОСЯ СТИКАТИСЯ З ПРОБЛЕМОЮ ВИПАДІННЯ ЗАЛОЗИ ТРЕТЬОЇ ПОВІКИ, ЯКУ ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, А ТАКОЖ БАГАТО КІНОЛОГІВ ПОМИЛКОВО НАЗИВАЮТЬ АДЕНОМОЮ ТРЕТЬОЇ ПОВІКИ – НОВОУТВОРЕННЯМ – І РЕКОМЕНДУЮТЬ ПРОВОДИТИ ЇЇ ВИДАЛЕННЯ. У ЦІЙ СТАТТІ МИ ОБГОВОРИМО ВСІ АСПЕКТИ ЦІЄЇ ПАТОЛОГІЇ, А ТОЧНІШЕ, ВСІ «ЗА» І «ПРОТИ».

## МІФ 1 – ЩО ЦЕ АДЕНОМА ТРЕТЬОЇ ПОВІКИ

Взагалі, аденома – це новоутворення (пухлина). Така нозологічна одиниця дійсно існує, і вона може зустрічатися, але в менш ніж 1 % випадків. Здебільшого, це просто пролапс (протрузія) слізної залози третьої повіки. Виглядає це, як утворення у внутрішньому куті ока, округлої рожевої припухлості, за формою і розміром нагадує квасолину. Буває одно- або двостороннім.

## МІФ 2 – ЩО ЇЇ ТРЕБА ВИДАЛЯТИ

Багато кінологів та лікарів загальної практики радять проводити видалення аденоми третьої повіки з одночасним видаленням і самої третьої повіки, і аденоми. НІ В ЯКОМУ РАЗІ цього робити не можна! До мене приходять власники тварин, яким були проведені подібні операції і наслідки їх дуже сумні – через деякий час після таких операцій (від 6 міс до декількох років) сльозопродукція на оперованому оці зменшується. У нормі ця додаткова залоза третьої повіки продукує до 30–40 % сльози. Як наслідок, розвивається сухий кератокон'юнктивіт, який веде до утворення виразкового кератиту та пігментного кератиту, що призводять до сліпоти й ускладнюються постійними гнійними виділеннями і запаленням в оці.

## МІФ 3 – ЩО НІЧОГО НЕ ТРЕБА РОБИТИ, САМО ПРОЙДЕ, ЧИ ВПРАВИТИ НАЗАД

Можна вправити залозу назад, і на деякий час вона зафіксується. Це відбудеться за умов, якщо вона не збільшена, не збуджена і не інфікована. Але наше завдання ще й уберегти піддану зовнішнім впливам слізну залозу від висихання,

запалення, вторинного інфікування і непривабливого зовнішнього вигляду, а також зберегти її секреторну функцію. Тому єдиним методом лікування є фіксація залози в правильному анатомічному положенні хірургічним способом. Існує декілька методик проведення оперативного втручання.

ОТЖЕ, ОКРУГЛЕ РОЖЕВЕ АБО ЧЕРВОНЕ УТВОРЕННЯ У ВНУТРІШНЬОМУ КУТОЧКУ ОКА, ЩО РІЗКО З'ЯВИЛОСЬ, ЦЕ ПРОЛАПС, АБО ПРОТРУЗІЯ, ЗАЛОЗИ ТРЕТЬОЇ ПОВІКИ

Причинами випадіння залози є слабкість зв'язок, що утримують її в нормальному положенні, виворіт хряща третьої повіки, нещільне прилягання третьої повіки до рогівки (так звані пухкі повіки). Провокують пролапс залози третьої повіки різкі рухи головою, стрибки, травми, а також запальні процеси ділянки ока та повік.

НАЙЧАСТІШЕ ЦЕ ТРАПЛЯЄТЬСЯ У ВІЦІ ДО РОКУ

Як правило, це спадкове захворювання і є ряд порід, схильних до пролапсу залози. Це практично всі брахіоцефалічні породи, собаки з короткою мордою і опуклими очима (мопс, англійський бульдог, пекінес), група молосів, собаки з пухкою підшкірною жировою клітковиною (дог, кане корсо, мастіно, боксери), американський кокер спаніель, бігль, чіхуахуа, кішки персидської і британської порід та ін.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ – ЦЕ СВОЄЧАСНЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО КЛІНІКИ, ПРАВИЛЬНА ДІАГНОСТИКА І ВОЛОДІННЯ ТЕХНІКОЮ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ЛІКАРЯ-ОФТАЛЬМОЛОГА. ДОТРИМАННЯ ЦИХ ПРАВИЛ ГАРАНТУЄ ВАШОМУ ВИХОВАНЦЕВІ ПОВНЕ ОДУЖАННЯ І ВИКЛЮЧИТЬ РЕЦИДИВ ЗАХВОРЮВАННЯ. ■

КОЖУХАР ЯНА ГЕОРГІЇВНА
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР, ОФТАЛЬМОЛОГ
ВЕТЛІКАРНЯ НИЗЬКИХ ЦІН
ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 5Б
ТЕЛ.: (044) 337-19-73

ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ НИЗЬКИХ ЦІН – ПРИНЦИПОВО НОВИЙ ПРОЕКТ, ЩО НЕ МАЄ АНАЛОГІВ У КИЄВІ.

вул.М.Малиновського,5б
(044) 337-19-73
вул.Драгоманова,1д
(044) 390-19-40

Основне наше кредо – це висока якість послуг згідно з європейськими стандартами лікування, високий рівень професіоналізму лікарів та комфорт в обслуговуванні за помірну, обґрунтовану ціну.

Чому наші ціни нижчі, ніж в інших ветеринарних клініках?

Ми маємо можливість співпрацювати з найкращою сертифікованою ветеринарною лабораторією м. Києва, та кращими ветеринарними діагностичними центрами на особливих умовах, отже маємо змогу надати Клієнтам нашої мережі значні знижки.

ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ НАМ ПРОВОДИТИ:

- повний спектр лабораторних досліджень;
- повний спектр інструментальної діагностики;
- хірургічні втручання будь-якої складності, включаючи нейрохірургію та ендоскопічні операції;
- консультації спеціалістів вузького профілю, в тому числі онколога, кардіолога, ендокринолога та інших ЗІ ЗНИЖКОЮ 12-20 % ВІД ПРАЙСОВИХ ЦІН ДІАГНОСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ-ПАРТНЕРІВ.

Що ми пропонуємо нашим клієнтам?

ПОВНИЙ СПЕКТР НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИХ ПОСЛУГ:

- прийом та консультацію;
- постановку діагнозу та призначення лікування;
- лікування в умовах денного стаціонару;
- вакцинацію та чіпування;
- грумінг;
- зоомагазин.

КЛІНІКА Є ПАРТНЕРОМ МЕРЕЖІ ВЦ «АЛДЕН-ВЕТ»

ВЕТ ЛІКАРНЯ НИЗЬКИХ ЦІН

# ХВОРОБИ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА

В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ТА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОДИ ЛІКАРІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЧАСТО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ З РІЗНОМАНІТНИМИ НЕВРОЛОГІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНУ СИМПТОМАТИКУ: КУЛЬГАВІСТЬ, ПАРАПЛЕГІЇ, ТЕТРАПЛЕГІЇ, ПОРУШЕННЯ КООРДИНАЦІЇ, РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ТА ПОРУШЕННЯ КООРДИНАЦІЇ. НАЙЧАСТІШОЮ ПАТОЛОГІЄЮ, З ЯКОЮ МИ СТИКАЄМОСЯ, Є ПАТОЛОГІЯ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ.

Ураження спинного мозку характеризуються ознаками ураження верхнього моторного нейрона (наприклад, посилені сегментальні рефлекси) і нижнього моторного нейрона (ослаблення або відсутність рефлексів і відсмикування на місці ураження).

Хвороби міжхребцевих дисків грудопоясничного відділу складають близько 85 %, шийного — 15 %.

## ЕКСТРАДУРАЛЬНА КОМПРЕСІЯ СПИННОГО МОЗКУ ПРИ ДЕГЕНЕРАЦІЇ, ПРОТРУЗІЇ АБО ЕКСТРУЗІЇ МПД

Розрізняють два типи за Хансеном:

ТИП 1 — метаплазія хряща желатинозного ядра, яке відзначається в молодому віці, від 8 місяців до 6 років, у хондродистрофічних порід (такс, лхаського апсо, ши тцу, біглів, кокер спанієлів, французьких бульдогів) та призводить до мінералізації ядра диска і подальшої його екструзії через дорсальну частину фіброзного кільця. Найчастіше захворювання зустрічається у віці 3—6 років.

ТИП 2 — фіброзна дегенерація желатинозного ядра, яка виникає у порід нехондродистрофічного типу (зазвичай у великих порід собак) і призводить до протрузії фіброзної маси через частково розірвану дорсальну частину фіброзного кільця. Кальцифікація диска і екструзія зустрічаються рідко.

А — нормальні відношення між міжхребцевим диском і спинним мозком.

NP — пульпозне ядро;
B — екструзія (видавлювання) диска Хансена 2-го типу, при цьому утворюється грижа пульпозного ядра в хребетний канал через розірване фіброзне кільце;
C — порториз (випинання) диска Хансена 2-го типу з випиранням фіброзного кільця в хребетний канал.

## СПОНДІЛОМІЄЛОПАТІЯ В ШИЙНОМУ ВІДДІЛІ, ТАКОЖ НАЗИВАЄТЬСЯ НЕСТАБІЛЬНІСТЮ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ – СИНДРОМ ВОБЛЕРА.

Найчастіше спостерігається у датських догів молодше 2 років, доберманів 3—9 років. У інших порід зустрічається рідше. Викликає компресію спинного мозку внаслідок стенозу хребетного каналу, нестабільності каудальних шийних хребців і гіпертрофії зв'язок на дні хребетного каналу. Як прояв ускладнення — екструзія міжхребцевого диска може призводити до різкого посилення ознак у хворих тварин.

## КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ

А. Дуже швидкий, гострий прояв болю, атаксії і парезу. Захворювання міжхребцевих дисків у шийному відділі найбільш часто характеризується ригідністю шиї, болем при маніпуляціях з шиєю, спазмом м'язів і відмовою рухатися. Неврологічний дефіцит зазвичай більш помітний при захворюванні міжхребцевих дисків у грудному відділі.

Б. Неврологічний дефіцит залежить від локалізації і ступеня компресії спинного мозку. Ознаки ураження нижніх моторних нейронів відзначаються на передніх кінцівках, якщо уражено шийне потовщення (C6—T2), і на задніх кінцівках, якщо уражено поперекове потовщення (L4—S3). Компресія на рівні T3—L3 зустрічається найбільш часто (85 %), особливо

на рівні T11,12, L1—2. У результаті з'являються ознаки ураження верхнього моторного нерва (спастичні рефлекси) тазових кінцівок. У тварин із захворюванням шийних міжхребцевих дисків у шийному відділі можуть відзначатися «корінцеві» ознаки (кульгавість грудних кінцівок внаслідок компресії корінця нерва).

B. Незначна компресія викликає атаксію і порушення пропріоцепції. Більш сильна компресія викликає втрату довільної рухової функції. Сильна компресія призводить до втрати поверхневої і глибокої чутливості до болю ураженої кінцівки.

Часто спостерігається сильний біль у спині і шиї. Тварин з таким болем часто приводять на прийом з анорексією і пригніченням. На больовому синдромі тварини можуть поводитися неадекватно, проявляти сильне занепокоєння, а іноді і агресію.

Захворювання МХС у шийному і грудопоперековому відділах може бути неправильно діагностовано, наприклад, як захворювання шлунково-кишкового тракту через ригідність і напруження м'язів живота, прийнятих за абдомінальний біль. Сечовий міхур часто розтягнутий через втрату довільного контролю сечовипускання і підвищеного тонусу сфінктера уретри.

## ВЗАГАЛІ, ЗА ДАННОЇ ПРОБЛЕМИ, КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ ПОДІЛЯЮТСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ:

**1-й ступінь** — больові відчуття;
**2-й ступінь** — парез/атаксія тазових кінцівок, біль;
**3-й ступінь** — собака не може стояти без сторонньої допомоги, довільні рухи;
**4-й ступінь** — параліч тазових кінцівок, нездатність стояти;
**5-й ступінь** — параплегія, затримка сечовипускання;
**6-й ступінь** — параплегія, атонія сечового міхура;
**7-й ступінь** — мієломаляція спинного мозку.

## ДІАГНОСТИКА

Анамнез, епізоотологічні дані та неврологічне обстеження дозволяють поставити можливий діагноз. Рентгенографічні ознаки захворювання міжхребцевих дисків включають звужений, клинчастий міжхребцевий простір або повну його відсутність, стислі суглобові поверхні, звуження міжхребцевого отвору або підвищену щільність у його просвіті, а також кальцифіковану речовину міжхребцевого диска в хребетному каналі. Найчастіше для правильного встановлення діагнозу потрібна загальна анестезія.

Мієлографія показана, коли на оглядовій рентгенограмі спостерігаються численні поразки або коли рентгенографічні знахідки суперечать результатам неврологічного обстеження. КТ і МРТ дають найбільш точний діагноз, ніж проведення мієлографії. Також рекомендовано проведення аналізу сечі з культуральним дослідженням і визначенням чутливості до антибіотиків, оскільки часто зустрічаються інфекції сечового міхура. Обов'язковим є дослідження на наявність тропних інфекцій до хрящової тканини, таких, як хвороба Лайма і ерліхіоз. Пункція цереброспінальної рідини показана для обстеження пацієнтів з багатоджерельною неврологічною симптоматикою, ознаками запалення ЦНС. Цереброспінальну рідину слід отримувати для визначення вмісту білка, посіву на бактерії і грибки, цитологічного дослідження.

## ЛІКУВАННЯ

Медикаментозна терапія показана при мінімальному нападі болю в шиї або спині та при мінімальному неврологічному дефіциті. Клітинний режим або обмеження в клітці/переносці на 3—4 тижні з подальшим поступовим поверненням до нормальної активності — найбільш важливий аспект консервативної терапії. Протизапальні, знеболювальні, антибіотикотерапія до результатів бактеріологічного дослідження

ЦСР. М'язові релаксанти також будуть знижувати вираженість хворобливих м'язових спазмів.

## ДО ПОКАЗАНЬ ХІРУРГІЧНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ ВІДНОСЯТЬ:

- погіршення неврологічного статусу, незважаючи на медикаментозну терапію;
- втрату або відсутність довільної рухової функції;
- рецидивні напади захворювання МХД;
- біль, який не відповідає на медикаментозну терапію, а також, якщо є прямі показання після проведення МРТ або КТ.

Втрата глибокої больової чутливості вказує на сильну компресію спинного мозку та несе обережний несприятливий прогноз. Для отримання найкращого результату необхідно якомога швидше провести операцію.

ЗАХВОРЮВАННЯ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ У ШИЙНОМУ ВІДДІЛІ ЗАЗВИЧАЙ ЛІКУЮТЬ ВЕНТРАЛЬНОЮ ДЕКОМПРЕСІЄЮ.

Дорсолатеральна геміламінектомія є зазвичай методом вибору при захворюванні міжхребцевого диска у грудопоперековому відділі. Прилеглі міжхребцеві диски можуть бути фенестровані.

При БМХД шийного відділу застосовується техніка декомпресії за допомогою вентральних щілин. Дана методика полягає у свердлінні «вікна» в міжхребцевому диску. Вміст диска,

який було зміщено в хребетний канал, повністю видаляється, що забезпечує декомпресію спинного мозку.

МЕТА ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ПЕРШ ЗА ВСЕ, ЦЕ ЗМЕНШЕННЯ БОЛЮ, ПОКРАЩЕННЯ НЕВРОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВІВ ХВОРОБИ.

При хворобі міжхребцевих дисків грудного або поперекового відділів хребта застосовуються такі методики лікування хвороби міжхребцевих дисків, як дорсальна ламінектомія та геміламінектомія.

Ламінектомія полягає у видаленні остистих відростків і дуг хребців, при цьому суглобові поверхні залишаються недоторканими. Геміламінектомія полягає у видаленні суглобових надростків хребців і бічної стінки хребетного каналу. Дана методика дозволяє отримати кращий доступ до речовини міжхребцевих дисків, ніж в першому випадку.

МЕТА ДАНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛЯГАЄ ТАКОЖ У ЗНЯТТІ КОМПРЕСІЇ ЗІ СПИННОГО МОЗКУ, ПОКРАЩЕННЯ НЕВРОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТВАРИНИ ТА УСУНЕННЯ БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТІВ.

Більшість собак відчувають виражене зменшення болю протягом 24—36 годин після декомпресивної операції, а усунення неврологічного дефіциту спостерігається поступово, протягом 2—4 тижнів. Фізичні навантаження обмежуються протягом 2 тижнів, з подальшою фізіотерапією для прискорення одужання. Прогноз на повне одужання у собак становить від 80 до 90 % протягом 4 тижнів. Собаки з паралічем,

більш імовірно, будуть мати залишкові дефіцити, але приблизно 80 % цих собак зможуть самостійно пересуватися. Зрідка зустрічається підвивих хребців, після виконання операції з вентральним доступом, що викликає біль у шиї і посилення неврологічних дефіцитів.

Ці собаки потребують повторної діагностичної візуалізації (переважно магнітно-резонансної томографії) з подальшою стабілізацією, що дає хороший прогноз для одужання. ■

НЕРОДА ІННА ВАСИЛІВНА
ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ВЦ "АЛДЕН-ВЕТ"
ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ, 16А
ТЕЛ.: (044) 5021414

# МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЇ САНАЦІЇ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТВАРИН

МИ ПРОДОВЖИМО ТЕМУ ЗДОРОВ'Я РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТВАРИН, ЯКУ РОЗПОЧАТО В МИНУЛОМУ НОМЕРІ НАШОГО ВИДАННЯ.

Всі власники напевно звертали увагу на появу досить неприємного запаху з пащі тварин та неестетичного вигляду зубів братів наших менших (рис. 1, 2). Причиною цього є зубний наліт та камінь, які є однією з найпоширеніших патологій ротової порожнини домашніх улюбленців. Проблема серйозна і може призвести до повної втрати зубів, хронічної інфекції ротової порожнини, порушення травлення та навіть хвороб щелепи. У ветеринарії вже досить давно розроблені методи профілактики та лікування даної патології.

**РИС. 1, 2:** ЗУБНИЙ КАМІНЬ У СОБАКИ ТА КОТА ВІКОМ СТАРШЕ П'ЯТИ РОКІВ

АЛЕ ПРО ВСЕ ПО ПОРЯДКУ! ОТЖЕ:

• ЗУБНИЙ НАЛІТ – це набуте м'яке утворення, яке зустрічається, в основному, на коронці зуба в ділянці краю ясен. Якщо простіше, то це утворення, яке складається із залишок корму, слини та великої кількості бактерій. Він найчастіше утворюється на іклах та корінних зубах, рідше – на різцях. Як свідчить практика, найбільш схильними є тварини старше п'яти років та саме дрібні породи собак та коти. Його появі також сприяє годівля м'яким кормом та слабке навантаження на щелепи.

ТРИВАЛА ПРИСУТНІСТЬ НАЛЬОТУ НА ЗУБАХ ПРИЗВОДИТЬ ДО УТВОРЕННЯ ЗУБНОГО КАМЕНЮ.

• ЗУБНИЙ КАМІНЬ – це набуте утворення на місці нальоту, що виникає за рахунок його ущільнення (мінералізації) за участю солей кальцію, які є в слині. За місцем свого розташування зубний камінь буває надясенний та підясенний. Надясенний утворюється безпосередньо на вільній поверхні зуба і межує з краєм ясен. Зазвичай камінь має жовтий або коричневий колір, шорстку поверхню, яка сприяє відкладенню нових шарів та збільшує у такий спосіб його розмір. Слизова оболонка губ та щік, що знаходиться над ним, часто схильна до травмування та запалення. Підясенний зубний камінь розташовується на корені зуба в кишенях ясен і може незначно виступати на коронку. Він темно-зеленого кольору та твердіший за надясенний камінь. Зубний камінь провокує запалення ясен, й відповідно, викликає запалення тканин, що оточують зуб.

ЦІ ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ, ОСКІЛЬКИ ВИКЛИКАЮТЬ СИЛЬНЕ ЗАПАЛЕННЯ НЕ ЛИШЕ М'ЯКИХ ТКАНИН, АЛЕ Й КІСТОК ЩЕЛЕПИ.

Якщо ви все ж таки помітили у своєї тварини вищеописані ознаки, не варто впадати у відчай!

ВСЕ, ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ – ЗВЕРНУТИСЬ ДО ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ!

**РИС 3, 4:** СТАН ЗУБІВ ДО ТА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ САНАЦІЇ

ЯК В ГУМАННІЙ (ЛЮДСЬКІЙ), ТАК І В ВЕТЕРИНАРНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ ШИРОКОГО ЗАСТОСУВАННЯ НАБУВ МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЇ САНАЦІЇ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ (ПРОСТІШЕ КАЖУЧИ – ЧИСТКИ ЗУБІВ).

Є звичайно більш простий варіант – механічна очистка, але вона не дає такого якісного результату, а тим більше спричиняє тварині біль та стрес, і не завжди може здолати твердий камінь.

СУТЬ ЦІЄЇ ПРОЦЕДУРИ – ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО НАЛЬОТУ І ЗУБНОГО КАМЕНЮ З ПОВЕРХНІ ЗУБІВ (ЗУБНОЇ ЕМАЛІ) ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ, ЯКИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКАЛЕР.

Процес проходить завдяки впливу вібрації, створеної ультразвуком, який відокремлює наліт і камінь від поверхні зуба, не пошкоджуючи саму емаль.Проте, відмінності проведення цієї процедури у людей та тварин все ж таки існують.
На відміну від людини, звірі не можуть покірно сидіти з відкритим ротом, тому все це проводиться під місцевим знеболенням та медичним сном (поверхневим наркозом) – це дає змогу зменшити тривалість часу на виконання маніпу-

ляції, знижує до нуля стрес для тварини, підвищує якість чистки зубів до 100 %.

ОТЖЕ, ПЕРШИЙ КРОК – ЦЕ ПОТРАПИТИ НА ПРИЙОМ ДО ЛІКАРЯ. ТВАРИНІ БУДЕ ПРОВЕДЕНО ПОВНИЙ ОГЛЯД (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗВАЖУВАННЯ, ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА, ЧАСТОТИ ДИХАЛЬНИХ РУХІВ ТА СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ).

Враховуючи те, що більшість пацієнтів з проблемою зубного каменю вже знаходяться в зрілому віці, необхідно провести дослідження крові (загальний та біохімічний аналізи), а у порід з генетичною схильністю до серцевих патологій – ще й УЗД серця.

Це надасть змогу оцінити загальний стан тварини та мінімізувати й профілактувати негативні наслідки під час анестезії.

Тривалість ультразвукового зняття зубного каменю залежить від декількох факторів, але не займає багато часу.

Плюсом цього методу є те, що відсутнє руйнування зубної емалі, та одразу по закінченню зуби виглядають «як новенькі» (рис. 3).

Проте декілька днів потому необхідно самостійно проводити обробку ротової порожнини задля зняття запалення ясен та профілактики повторного відкладання нальоту.

Всю інформацію про домашнє лікування та рекомендації вам надасть лікар.

ЗВИЧАЙНО, ПРОФІЛАКТИКА – ЦЕ ЗАВЖДИ КРАЩЕ, АЛЕ ЯКЩО ПРОБЛЕМА ПОТРЕБУЄ НЕГАЙНОГО УСУНЕННЯ, ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРТАТИСЯ ДО БУДЬ-ЯКОЇ КЛІНІКИ НАШОЇ МЕРЕЖІ, ДЕ КВАЛІФІКОВАНІ СПЕЦІАЛІСТИ НАДАДУТЬ ВАШОМУ УЛЮБЛЕНЦЮ КВАЛІФІКОВАНУ ДОПОМОГУ! ■

КОЛОМІЄЦЬ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
ЛІКАР-ОРДИНАТОР
ВЦ АЛДЕН-ВЕТ
ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 15А
ТЕЛ.: (044) 500-35-35

# ВЦ Алден-Вет

## НАШІ ЮВІЛЕЇ

Цієї весни декілька наших клінік святкували свої юбілеї, та ми дійсно вражені, як швидко минає час, як багато зроблено та скільки нового чекає нас попереду. Сил та наснаги нашій команді надають засновники ВЦ «Алден-Вет» Тищенко Денис Геннадійович та Бондаренко Алла Віталіївна. Запорука нашого успіху - їх працьовитість та бажання йти вперед. Тому тільки так і тільки разом!

## НАМ 16 РОКІВ

У червні місяці мережа ветеринарних центрів «Алден-Вет» святкує своє 16-річчя. За цей час ми встигли відкрити 10 клінік, запустити 2 швидкі ветеринарні допомги, встановити 6 УЗД комплексів, здобути повагу партнерів, довіру клієнтів та, найголовніше, любов ваших чотирилапих улюбленців. Для нас є неймовірно важливим не тільки підтримувати роботу нашої команди, але і зростати задля збільшення рівню комфорту та безпеки наших пацієнтів.

## ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Разом із Всеукраїнською гільдією ветеринарів мережа ВЦ «Алден-Вет» в березні 2016 року провела наймасштабнішу міжнародну науково-практичну конференцію за всю історію України! Учасниками заходу стали більш ніж 1000 фахівців з різних країн.

Усі лікарі ВЦ «Алден-Вет» щорічно підвищують свою кваліфікацію по всьому світу. Лише за 3 місяці нами було відвідано та проведено більше 30-ти фахових конференцій та майстер-класів, як на території України, так і в інших Європейських державах.



# 16 років

## НОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Завдяки цілодобовій роботі наших діагностичних та лабораторних центрів, ми в змозі надавати своїм клієнтам швидку та якісну допомогу. Нещодавно ми отримали довгоочікувані реактиви іспанської компанії «Biosystems» для проведення тестів на жовчні кислоти, які дозволяють високоточно і швидко визначати рівень жовчних кислот. У нашій клініці на вул. А. Ахматової, 16А повністю оновлено ендоскопічне обладнання, а в клініці на вул. Героїв Дніпра, 18 встановлено новий УЗД апарат експерт класу. Ми працюємо тільки з якісним медичним обладнанням задля швидкого та відмінного результату.

## НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мережа ВЦ «Алден-Вет» разом із Всеукраїнською гільдією ветеринарів розробила сумісну ініціативу щодо проведення щомісячних ветеринарних конференцій у конференц-залі НУБіП з вільним доступом для усіх бажаючих. Учасниками заходу є не тільки досвічені лікарі, але й молоді фахівці та студенти. Програма конференцій розроблена задля отримання належного рівня знань, практики та нових досягнень у всіх галузях ветеринарного світу України.

## МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «АЛДЕН КЛУБ»

Тепер, задля того щоб записатись на прийом чи знайти найближчу до вас клініку, ви можете скористатись мобільним додатком «Алден Клуб». Де ви зможете не тільки скористатись нашими послугами, але й набирати бали і отримувати приємні подарунки. Нашою програмою лояльності користується вже більш ніж 5 000 користувачів і ми раді нашій співпраці.



# XIX

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ВЕТЕРИНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АЛДЕН-ВЕТ»

IVC_AUTUMN 2016

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ ВЕТЕРИНАРІВ

IVC ALDEN-VET

**9-10 вересня 2016**

М. КИЇВ

КИЇВЕКСПОПЛАЗА

**Реєстрація з 1.06.2016**

## СЕКЦІЇ:

- КАРДІОЛОГІЯ
- ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
- ОНКОЛОГІЯ
- НЕФРОЛОГІЯ
- ДЕРМАТОЛОГІЯ
- ХІРУРГІЯ И НЕВРОЛОГІЯ
- ІНФЕКЦІЙНІ ТА ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
- УПРАВЛІННЯ ЗООВЕТЕРИНАРНИМ БІЗНЕСОМ
- ЛІКУВАННЯ КОНЕЙ
- ЛІКУВАННЯ ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН

Якщо ви хочете стати партнером або доповідачем заходів, звертайтесь в орг. комітет!

Організаційний комітет:
aldenvet.pr@gmail.com
тел. : (044) 272-07-45
пн-пт : 10.00 до 18.00

# «ПІГУЛКА ВІД ПРОНОСУ» АБО «УКОЛ ВІД БЛЮВОТИ». А МОЖЕ, ВСЕ-ТАКИ ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ, А НЕ СИМПТОМІВ?

У собак і котів хвороби органів травлення займають перше місце серед інших незаразних хвороб. На їх частку, за статистикою, припадає понад 70 %. Блювота (нудота) і діарея у тварин є досить частим явищем, і можуть бути симптомами досить великої кількості як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. Що ж таке блювота з точки зору ветеринарної медицини? Блювота - мимовільне викидання вмісту шлунка через спазматичні скорочення м'язів шлунка, діафрагми.

Насправді цей процес можна вважати захисним рефлексом в організмі, тому що організм нібито намагається позбутися ендотоксинів, екзотоксинів або сторонніх предметів, виникає він за:

- НАЯВНОСТІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СТРАВОХОДІ (ІНОРІДНІ ПРЕДМЕТИ, МЕГАЕЗОФАГУС, ПУХЛИНИ), ПРИ ЦЬОМУ КОРМ АБО ВОДА МЕХАНІЧНО НЕ МОЖУТЬ ПРОЙТИ В ШЛУНОК;
- НАЯВНОСТІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ШЛУНКУ (ТАК САМО ІНОРІДНІ ПРЕДМЕТИ, ГАСТРИТИ, ВИРАЗКОВІ ПРОЦЕСИ, ПОРУШЕННЯ ФЕРМЕНТАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ШЛУНКУ);
- ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕЧІНЦІ, ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ, НИРКАХ.

### ХІБА МОЖНА НАШКОДИТИ ТВАРИНІ ЧЕРЕЗ УКОЛ МЕТОКЛОПРАМІДУ АБО ЕНТЕРОСГЕЛЬ?

Насправді, так! Основними властивостями метоклопраміду є не тільки зняття симптому блювоти, а й стимуляція роботи шлунково-кишкового тракту. У даному випадку, за наявності сторонніх предметів в шлунку і тонкому відділі кишечника, можна викликати хворобливе їх проходження по шлунково-кишковому тракту. Спазмування стінок кишечника в області положення стороннього предмета і, як наслідок, некроз стінок, а так само його розрив. Негативні наслідки однієї ін'єкції тягнуть за собою для власника недешеві витрати на лікування свого вихованця, а для тварини — важкий реабілітаційний період. Адсорбенти (активоване вугілля, ентеросгель, сорбекс і т.д.) так само протипоказані при кишковій і шлунковій непрохідності. Застосування цих препаратів виправдано при впевненості власників у поїданні твариною недоброякісного корму або отруйних речовин. Деякі власники тварин впевнені, що допоможуть своєму улюбленцю з інтенсивною блювотою, якщо будуть давати йому регідрон або відвари трав у великій кількості задля того, щоб відновити водно-електролітний баланс і уникнути зневоднення, не знаючи, що за наявності обтурації (закупорюванні) стравоходу можна викликати вкрай небезпечну аспірацію рідини в легені. Наслідком якої може стати аспіраційна пневмонія або навіть летальний результат.

### ХОЧУ НАВЕСТИ КІЛЬКА КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ, ЯКІ МАЛИ МІСЦЕ ЗА ОСТАННІ ДВА ТИЖНІ В НАШІЙ КЛІНІЦІ.

#### КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 1.

Кошеня, вік 3 міс. Останні 2 тижні кашель, непродуктивні позиви на блювоту, апетит збережений, воду п'є, проносу немає. Двотижневе застосування антибіотикотерапії в іншій клініці результатів не дало, здані аналізи на вірусні інфекції негативні. При рентгенівському дослідженні сторонніх предметів у стравоході і шлунку не виявлено, аналізи крові без істотних змін, тільки незначний запальний процес. При проведенні ендоскопії витягнута куряча кістка, яка була знайдена в гортані в проекції черпаловидного хряща, що ускладнило її візуалізацію при рентгенологічному дослідженні.

#### КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 2.

Собака, порода вест хайленд уайт тер'єр, вік 2,5 року. Зі слів власників, під час вигулу щось підібрав на вулиці, спостерігали виснажливі непродуктивні позиви на блювоту після прийому води і їжі через кілька секунд. При рентген-дослідженні виявлено чужорідний предмет в нижніх відділах стравоходу. За допомогою ендоскопії був витягнутий хребець телячого хвоста. До

вечора, після проведеної операції, собака почував себе добре і без проблем приймав їжу.

## ТАК МОЖЕ ВСЕ-ТАКИ ДІАГНОСТИКА, ПОСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО ДІАГНОЗУ І АДЕКВАТНЕ ЛІКУВАННЯ?

Що ж в себе включає діагностика блювоти. Це аналізи крові (загальний і біохімічний), УЗД - виключення проблем з печінкою, підшлунковою залозою, нирками. Рентген-діагностика з контрастуванням, ендоскопія. При проведенні ендоскопії можливо дослідження на наявність сторонніх предметів, що не візуалізуються при рентген-дослідженні, наявність виразкових процесів, можливий забір гістологічного матеріалу при підозрі на онкологічний процес. Всі ці дослідження можна провести швидко і якісно на базі клініки «Алден-Вет». Лапароскопічне витягання сторонніх предметів із стравоходу і шлунку мають малоінвазивний, а також повсякденний характер. При цьому тварина проходить швидкий, безболісний реабілітаційний період. А фінансові витрати власників набагато менші, ніж при рутинних оперативних втручаннях.

Діарея - позначення водянистого, розрідженого або частого стулу. Виникнення діареї криється в ряді причин. Пронос може бути спровокований кишковими інфекціями, гельмінтами, найпростішими грибками, хворобами підшлункової залози, печінки, недоброякісною їжею,

аутоімунними і пухлинними процесами, дрібними сторонніми предметами в кишечнику, дисбактеріозом.

Стикаючись з таким неприємним явищем, як пронос у собаки, багато собаківників схильні впадати в дві крайності: або повністю ігнорувати розлад травлення вихованця, пояснюючи його нешкідливими причинами типу «так нічого страшного, напевно, щось з'їв не те», або намагатися самостійно впоратися з проблемою. Найчастіше, крім адсорбентів, власники для зупинення діареї використовують імодіум (лоперамід), не знаючи, що цей препарат має безліч побічних ефектів і велику кількість протипоказань, таких як:

- вірусна інфекція (особливо якщо присутні згустки крові у випорожненнях і у пацієнта відзначається підвищена температура тіла);
- гострий виразковий коліт;
- псевдомембранозний коліт, який викликаний прийомом антибіотиків;
- бактеріальний ентероколіт;
- паралітичний ілеус та інші захворювання, що супроводжуються порушенням перистальтики кишечника;
- запор.

Використовуючи цей препарат при харчових токсикоінфекціях, зупиняється діарея, підвищується на 50 % всмоктування токсинів в організм тварини, ніж посилюється синдром інтоксикації організму. У цьому випадку виправдане застосування тільки адсорбентів.

Якщо ж пронос супроводжується такими симптомами, як млявість, температура, відмова від їжі, виділення з очей, носа, кашель, блювота, відмова від їжі і прийому води, необхідно звер-

нутися за професійною ветеринарною допомогою, оскільки це можуть бути симптоми гострої вірусної інфекції.

«Яка вірусна інфекція, ми ж зробили вакцинацію?» - поставлять запитання власники тварини з підозрою на вірусний ентерит або чуму. Як відомо, вакцинація захищає від зараження тварину на 95 % і на вироблення поствакцинального імунітету впливає багато факторів: чи була тварина абсолютно здоровою у день вакцинації (алергізація або прихований запальний процес) і чи був витриманий карантин. Яку ж діагностику важливо провести для встановлення етіології діареї? Це аналізи крові (клінічний і біохімічний), аналіз калу (має бути тільки свіжим). Для

виключення паразитарної діареї важливо піддавати дослідженню кал від одного до п'яти разів (5 днів поспіль), так як знайти яйця глистів не завжди можна в першій порції калу і це залежить від циклу розвитку паразитів. Так само стул можна піддати дослідженню на дисбактеріоз і наявність вірусних, грибкових та бактеріальних інфекцій. Для виключення наявності дрібних чужорідних предметів важливо проведення рентгенологічного дослідження з контрастуванням. На основі нашої клініки можливе проведення ендоскопії (колоноскопії), за допомогою якої доступно дослідження слизової оболонки кишечнику на наявність крововиливів, виразок, новоутворень, забір гістологічного матеріалу при підозрі на пухлинний процес. Розгорнутий аналіз калу (копрограма) може вказати на порушену екскреторну функцію підшлункової залози, холестаз, дисбактеріоз, виразковий процес в ШКТ, рівень запального процесу.

## КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 3.

Собака породи йоркширський тер'єр, вік 4 роки. Скарги на періодичне розрідження стулу, який при цьому був практично чорного кольору, неприємного запаху, наявність субфебрильної температури, апетит збережений. Щеплення зроблені 6 міс. тому. В іншій клініці застосування антигельмінтів, антибіотиків, пробіотиків результатів не дали. Лабораторні «знахідки»: наявність запального процесу, критичне зниження рівня лімфоцитів, показники червоної крові на нижній межі норми, підвищення печінкових трансаміназ на 80 % від норми. При копрологічному дослідженні наявність кишкового епітелію, прихованої крові, лейкоцитів. При специфічному дослідженні виявлено антиген чуми. При проведенні специфічного лікування (сироватки, антибіотики, гепатопротектори) протягом 4-х днів лікування випорожнення у собаки нормалізувалися.

## КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 4.

Французький бульдог, вік 1,5 міс. Лікування проводив на дому приватний ветеринарний лікар. Підозра на парвовірусний ентерит. Клініка: блювота жовчю і піною, відмова від їжі, пронос зі слизом жовтого кольору, загальна слабкість. Шестиденне проведення інфузійної терапії з використанням специфічних сироваток, антибіотиків результатів не дали. При дослідженні калу, знайдені цисти ізоспор у великій кількості. Проведена специфічна терапія - за 5 днів у цуценяти нормалізувався апетит і стул.

### КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 5.

Собака, порода джек рассел тер'єр, вік 3 роки. Зі слів господарів, протягом двох місяців у собаки відзначається багаторазова діарея, загальний стан при цьому в нормі, активність збережена. Застосовували всілякі адсорбенти, трави і дієти. Результат негативний. При лабораторному дослідженні крові та копрограмі істотних змін не було виявлено. Було прийнято рішення провести колоноскопію, а також фіброгастроскопію. Були виявлені вогнища ураження і запалення тонкого відділу кишечника, а також були відібрані зразки запаленої і ураженої тканини на гістологічне дослідження. За результатами гістології була призначена специфічна терапія, яка мала позитивну динаміку завдяки правильній діагностиці. Зробивши висновки, можна сказати, що всі вищевказані випадки доводять наступне, а саме - аби швидко та якісно провести лікування, важливо встановити етіологію захворювання і лікувати хворобу, а не симптом. При цьому і власники понесуть незначні фінансові витрати, і тварина швидко, а головне, успішно впорається із захворюванням. Найголовніша істина полягає в тому, що кваліфіковані ветеринарні лікарі, так само, як і всі люди, що займаються своєю справою, правильно і точно справляються з поставленими завданнями. Тому хочеться побажати всім міцного здоров'я і щоб кожен займався своєю справою, як кажуть: «Кесарю кесареве, слесарю слесареве!». ■

НЕРОДА ІННА ВАСИЛІВНА
ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ВЦ АЛДЕН-ВЕТ
ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ, 16А
ТЕЛ.: (044) 502-14-14

# ДЛЯ ВСІХ ПОРІД СОБАК

- Принципово новий клас захисту від кліщів і бліх
- Розроблений спеціально для собак. Дозволений для застосування у вагітних, лактуючих сук та цуценят з 8 тижнів
- Безпечний для собак з дефектом гену MDR-1 та брахіоцефалів
- Має привабливий смак для собак
- Зручний у використанні – одна таблетка (фасування в залежності від ваги собаки)
- Дати таблетку можна всього за 12 годин до можливого контакту з кліщами та блохами
- Загибель кліщів до початку живлення на собаці
- Швидка загибель кліщів незалежно від місця прикріплення

Представництво «Інтервет Бейджеліз Б.В.» в Україні
03680, Україна, м.Київ, вул. Амосова, 12,
3-й поверх БЦ «Горизонт Парк»
Тел.: 044 393 74 60, факс: 044 393 74 91

MSD Animal Health

# ТОП-5 ЛІТНІХ НЕБЕЗПЕК ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

КОЛИ НА ВУЛИЦІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ТЕПЛА ПОГОДА І ПОЧИНАЮТЬСЯ ВИЇЗДИ НА ПРИРОДУ, ДАЧУ АБО У ЛІС - НАШІ ВИХОВАНЦІ БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У НАШИХ ПЛАНАХ. І ДЛЯ ТОГО, ЩОБИ ВІДПОЧИНОК НЕ ЗАКІНЧИВСЯ НЕПРИЄМНОСТЯМИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ, ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПІДСТЕРІГАЮТЬ НА ПРИРОДІ НАШИХ УЛЮБЛЕНЦІВ.

1 Одна з перших неприємностей, з якою стикаються наші улюблені вихованці при виїзді на природу, - це кліщі. Для домашніх тварин кліщі загрозливі у першу чергу тим, що вони переносять дуже небезпечні кровопаразитарні захворювання: бабезіоз (або піроплазмоз), ерліхіоз і анаплазмоз. Всі ці захворювання можуть призвести до смерті тварини. Зараження відбувається під час укусу вихованця.

ОСНОВНІ СИМПТОМИ ЗАРАЖЕННЯ:

- млявість,
- відмова від їжі,
- небажання йти на прогулянку,
- сонливість,
- блювота,
- діарея,
- підвищення температури,
- зміна кольору сечі.

За наявності будь-яких з цих симптомів слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря для правильної постановки діагнозу і призначення вчасного лікування.

Важливо: Власники не завжди знають, як правильно видаляти кліща, якого вони помітили на своїй тварині. Через незнання, при спробі видалити його, ми залишаємо його частину

під шкірою. Це відбувається через те, що кліщ дуже міцно впивається в шкіру і власники намагаються його не викручувати, а просто виривають, тим самим залишаючи його голівку під шкірою. Для того щоб повністю видалити кліща, краще використовувати спеціальні пристосування, які схожі на вигнутий пінцет. Якщо ви не знаєте, як правильно видалити кліща з вашої тваринки, краще зверніться до ветеринара, який підкаже, як це правильно зробити. Після того як кліща видалено, місце укусу слід обробити звичайними розчинами-антисептиками, наприклад, хлоргексидіном.

2 На природі або на дачі наші вихованці стикаються з комарями. Комарі дошкуляють нашим вихованцям не тільки незручностями у вигляді укусів, але й можуть бути переносниками такого небезпечного захворювання, як дирофіляріоз, яке становить небезпеку і для людини. Під час укусу через ротовий отвір інфікованого комара у кров тварини потрапляють личинки дирофілярій. Дирофілярії дозрівають до дорослих особин протягом 6-8 місяців. Статевозрілі особини починають розмножуватися безпосередньо у тварині і можуть викликати навіть її смерть.

### СИМПТОМИ НАЯВНОСТІ ДИРОФІЛЯРІЙ У ТВАРИНИ:

- задишка;
- швидка втома;
- кашель;
- проблеми з серцево-судинною та дихальною системою;
- тромбоз (закупорка) судин.

За наявності хоча б одного з цих симптомів краще звернутися до ветеринарного лікаря для правильної діагностики та допомоги вашому вихованцеві. Адже це захворювання дуже небезпечне для тварини.

Також комарі та блохи, з якими контактувала тварина, можуть викликати у неї алергічні реакції. Найчастіше тварини реагують на слину бліх і комарів. При цьому, місце укусу може почервоніти і викликати у тварини сильний зуд. Якщо ви помітили розчесані ділянки на шкірі тварини після виїзду на природу, краще не відкладати візит до ветеринарного лікаря, аби якнайшвидше визначити причину і отримати лікування.

Для того щоб наші вихованці були в безпеці від ектопаразитів, їх потрібно регулярно обробляти від них. Краплі застосовують один раз на 3-4 тижні, для того щоб зберегти максимальну концентрацію препарату в крові. Тварину краще обробляти за 3 дні до купання або через 3 дні після купання, якщо це зробити раніше, ефекту може не бути і тварина знов буде уражена паразитами. Також тварину можна обробляти за допомогою спеціальних нашийників. Їх ефект становить від 3 до 6 місяців. Зараз на ринку ветеринарних препаратів з'явилися спеціальні таблетки від бліх і кліщів, як от: Bravecto (захист до 3 місяців) і Nexgard (захист до одного місяця).

Перед виїздом на природу тварину також слід додатково обробити спеціальними спреями від комарів. Якщо ви не знаєте, як правильно підібрати захист для свого вихованця, краще порадьтеся з ветеринаром.

3 Під час прогулянки в лісі або перебуваючи на дачі, вихованець може бути покусаний гризуном (щуром або мишею). Найчастіше це може відбутися через надмірну природну цікавість вихованця, його бажання погратися з ним або й полюючи на нього. Під час укусу гризун може інфікувати домашню тварину такими захворюваннями, як сказ і лептоспіроз, які є смертельно небезпечними не лише для вашого вихованця, але й для вас.

ПРИ ВИЯВЛЕННІ МІСЦЯ УКУСУ СЛІД НЕГАЙНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ. ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЗАХИСТИТИ ВАШОГО ВИХОВАНЦЯ, ПОТРІБНО РЕГУЛЯРНО, ОДИН

РАЗ НА РІК, РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЮ ВАКЦИНОЮ ВІД ВІРУСНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЛЕПТОСПІРОЗУ ТА СКАЗУ. ТІЛЬКИ У ТАКИЙ СПОСІБ ВИ ЗМОЖЕТЕ ЗАХИСТИТИ І СЕБЕ, І ВАШОГО ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ.

4 Також наші вихованці, перебуваючи на природі, можуть бути покусані комахами, мухами, осами та бджілами, місце укусу яких так само може викликати дискомфорт у тварини. Намагаючись відігнати їх від себе, наші

улюбленці тільки провокують небезпечних комах, оскільки останні можуть покусати тварину та залишити жало. Внаслідок чого у тваринки можуть розвинутися вкрай небезпечні алергічні реакції. Розпухла морда чи лапа, почервоніння шкіри, або й набряк гортані, що є найбільш серйозним проявом алергічної реакції, який може призвести навіть до її смерті. Якщо ви помітили прояви алергії у тварини, їй негайно слід дати антигістамінні препарати (лоратадин, супрастин) та максимально швидко доставити до ветеринарного лікаря, який надасть термінову кваліфіковану допомогу.

5 Вихованці дуже люблять гратися та бігати у траві, у якій їх також може підстерігати небезпека. Наприклад, під час бігу випадково натрапити на змію. Змії вкрай небезпечні для домашніх тварин. Найчастіше через свою природну цікавість наші улюбленці страждають від їхніх укусів. Якщо ви помітили кров на вашій тварині, уважно огляньте її, адже можливо це слід від укусу змії. Якщо виявлено укус на лапі, необхідно накласти джгут вище рани - це сповільнить розповсюдження отрути по кровоносних судинах. Якщо ж знайшли в іншому місці, тоді необхідно максимально сильно натиснути на ранку - це також сповільнить розповсюдження отрути по організму. Але якщо ви не відразу помітили укус, вас повинні насторожити такі симптоми, як млявість, апатія, рвота, підвищення температури, посиніння в ділянці укусу, нервові судоми. За наявності будь-яких з цих ознак потрібно терміново відвезти тварину у ветеринарну клініку .

Наші улюбленці – як маленькі діти, яким потрібно все обнюхати, спробувати на дотик, й навіть на зуб. Тому найчастіше тварини страждають від отруєнь. Отруйні речовини зазвичай розкидають у місцях частого вигулу собак. Такі речовини можуть бути замасковані або просто розкидані у вигляді порошку. Отруєння відбувається при попаданні небезпечної речовини в ШКТ або ж при вдиханні через верхні дихальні шляхи тварини. Отруєння без надання термінової ветеринарної допомоги може закінчитися летально.

ЗАДЛЯ УНИКНЕННЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО ДОТРИМУВАТИСЯ ДЕКІЛЬКОХ ПРАВИЛ:

1. Якщо ви помітили, що тварина жує щось підозріле, постарайтеся відібрати це і максимально очистити ротову порожнину від з'їденого.
2. Дайте тварині сорбенти (активоване вугілля, ентеросгель або атоксил).
3. Намагайтеся у тварини викликати рвоту (це можна зробити за допомогою кухонної солі, яку потрібно покласти на корінь язика).
4. Терміново звернутися до ветеринарної клініки для надання кваліфікованої ветеринарної допомоги.

Якщо у тварини почалися вищеописані клінічні симптоми, такі як апатія, млявість, рвота, пронос, судоми - потрібно негайно їхати у ветеринарну клініку, щоб встановити діагноз і, найголовніше, надати термінову допомогу.

БРИЛЬКОВА ДАР'Я ВАЛЕРІЇВНА
ЛІКАР-ОРДИНАТОР
ВЦ «АЛДЕН-ВЕТ»
ПР. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20
ТЕЛ.: (044) 463-49-39

# ТЕПЛОВИЙ УДАР

На початку літа дуже важливо розглянути актуальне для спекотної пори року питання про такий небезпечний для життя тварини стан, як тепловий удар. Основною причиною теплового удару є перебування тварини у закритому приміщенні або у місці, що не провітрюється. Перш за все, йдеться про перебування у машині або вигул брахіоцефалічних порід собак із густим шерстним покривом у найспекотніші години дня.

Тварина сприймає високу температуру зовсім не так, як людина. Як відомо, при надмірній теплопродукції тварини не мають такого компенсаторного механізму, як потовиділення. Єдиною можливістю позбавитися надлишку тепла для наших улюбленців є прискорене дихання (тахипне). Але воно, на жаль, обмежене у своїй ефективності, і тварина внаслідок перегріву отримує важкі наслідки:

- НАБРЯК ГОЛОВНОГО МОЗКУ;
- НИРКОВУ НЕДОСТАТНІСТЬ;
- НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ЗГОРТАННЯ КРОВІ (ДВЗ СИНДРОМ).

Всі ці патології призводять до загибелі організму або отримання невиправних для нормальної життєдіяльності організму наслідків.

За наявності цих симптомів необхідно терміново вжити таких заходів:

- позбавити тварину впливу джерела тепла;
- поміряти і контролювати температуру тіла лише ректально, а не за допомогою мочки носа;
- обкласти холодом (змочені рушники, лід на голову, змочити слизові оболонки), зробити холодні компреси в ділянці паху;
- напоїти холодною водою, якщо є така можливість;
- найголовніше - терміново звернутися до лікаря.

Чого робити не потрібно:

- поливати струменем крижаної води;
- занурювати у холодну ванну;
- у жодному випадку не робити жарознижувальні ін`єкції;
- не вживати заходів самолікування тварин, оскільки іноді йдеться про хвилини життя, і

втрачати їх неможливо.

• охолоджувати тварину дуже швидко. За 30-60 хвилин потрібно знизити температуру до 39–39,5 °С і зупинитися.

Слід забезпечити свою тварину цілодобовим доступом до свіжої води кімнатної температури та пам`ятати, що температура повітря у зачиненому приміщенні небезпечніша за прямий тепловий удар.

Заходи профілактики:

• не залишати тварину в закритій машині, ані в тіні, ані на прямому сонячному світлі;

• не гуляти у пік активності сонця. Краще це робити вранці та ввечері;

• брати на прогулянку з собою воду і поїлку, можна навіть пульверизатор з водою для оприскування тварини;

• брахіоцефалам виключити будь-які фізичні навантаження у спекотну погоду.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ПРОФІЛАКТУВАТИ ХВОРОБУ ЛЕГШЕ, НІЖ ЇЇ ЛІКУВАТИ, І ГРОШІ, ВИТРАЧЕНІ НА ЛІКУВАННЯ ТВАРИНИ, НІКОЛИ НЕ ПРОПОРЦІЙНІ ВІДНОВЛЕННЮ ЗДОРОВ'Я, ЯКЕ ТВАРИНА МОЖЕ ВТРАТИТИ НАЗАВЖДИ. ■

ШЕВЧЕНКО ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР, ДЕРМАТОЛОГ
ВЕТЛІКАРНЯ НИЗЬКИХ ЦІН
ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 1Д
ТЕЛ.: (044) 390-19-40

## ОЗНАКИ ТЕПЛОВОГО УДАРУ У ТВАРИНИ:

• ЗАДИШКА (ЗБІЛЬШЕНА ЧАСТОТА ДИХАЛЬНИХ РУХІВ У ПОРІВНЯННІ З НОРМОЮ);

• ТАХІКАРДІЯ (ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ);

• ВИДИМІ СЛИЗОВІ ОБОЛОНКИ СУХІ І ЯСКРАВО ЧЕРВОНІ, А ПРИ ШОЦІ – СИНЬОГО КОЛЬОРУ;

• МЛЯВІСТЬ І РІЗКА СЛАБКІСТЬ, СУДОМИ, ТРЕМТІННЯ, АЖ ДО ВТРАТИ СВІДОМОСТІ І НЕПРИТОМНОСТІ;

• ШВИДКЕ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА (ДО 41 °С І ВИЩЕ).

## ДО ГРУПИ РИЗИКУ ПОТРАПЛЯЮТЬ СОБАКИ:

- З ГУСТИМ ШЕРСТНИМ ПОКРИВОМ;
- БРАХІОЦЕФАЛІЧНІ ПОРОДИ (МОПС, ФРАНЦУЗЬКИЙ І АНГЛІЙСЬКИЙ БУЛЬДОГИ, ЧІХУАХУА);
- ТВАРИНИ, ЩО МАЮТЬ ХРОНІЧНІ ХВОРОБИ (СЕРЦЕВО-СУДИННА НЕДОСТАТНІСТЬ, ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ);
- СТАРІ ТВАРИНИ.

## ВАЖЛИВО:

**ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТВАРИНИ ПРИ ТЕПЛОВОМУ УДАРІ ЛІКАРІ ЗАСТОСОВУЮТЬ НЕ УКОЛЬЧИКИ ВІТАМІНОК І ГОМЕОПАТІЇ, А ВЖИВАЮТЬ ДІЄВИХ ЗАХОДІВ:**

- ІНФУЗІЙНУ ВНУТРІШНЬОВЕННУ ТЕРАПІЮ;
- ІНТУБАЦІЮ ТРАХЕЇ, ДЛЯ АДЕКВАТНОГО НАСИЧЕННЯ КРОВІ КИСНЕМ, СПЕЦІАЛЬНИМИ КИСНЕВИМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ;
- МОНІТОРИНГ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ, СЕЧІ;
- УЗД-ДІАГНОСТИКУ.

# ЯКЩО ВАШ СОБАКА ЛЮБИТЬ КУПАТИСЯ

СОБАКИ ДУЖЕ ЛЮБЛЯТЬ КУПАТИСЯ, А В ЛІТНІЙ ПЕРІОД — ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЗАДОВОЛЕННЯ, АЛЕ Й ПРЕКРАСНИЙ СПОСІБ ОСВІЖИТИСЯ. ОДНАК ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВИХОВАНЕЦЬ НЕ ПІДХОПИВ ПРИ ЦЬОМУ ІНФЕКЦІЮ, ЩОБ НЕ ЗАСТУДИВСЯ І НЕ ТРАВМУВАВСЯ, КУПАТИ СОБАКУ ПОТРІБНО ПРАВИЛЬНО, ВИБИРАЮЧИ ДЛЯ ЦЬОГО БЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ І ДОТРИМУЮЧИСЬ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ГІГІЄНИ.

Плавання — дуже корисне для вашого улюбленця, воно сприяє зміцненню імунітету, розвитку м'язового каркаса і підвищує витривалість. Але це можливо тільки в тому випадку, коли купання собак виконується з урахуванням усіх фізіологічних особливостей вашого вихованця.

## ОСНОВНІ ПРАВИЛА КУПАННЯ СОБАКИ

Для початку потрібно ретельно вибрати місце. Якнайкраще для цього підійде водойма, яка відкрита СЕС для людей. Якщо там немає знаку «Собакам купання заборонено», можете сміливо відправляти вихованця у воду. Якщо такого пляжу поблизу немає, можна вибрати просто чисту водойму з проточною водою і пологими, не слизькими берегами.

Температура води, в якій ваш собака збирається покупатися, не повинна бути нижче 20 градусів, інакше вихованець може застудитися. Час купання не повинен перевищувати 15 хвилин, особливо в перший раз. Йти на пляж з собакою краще або вранці до 12 годин, або ввечері після 17, і головне — до прийому їжі.

На час купання нашийник з вихованця краще знімати, щоби він не міг зачепитися ним за які-небудь корчі. Після купання не варто відразу надягати його назад, щоб шкіра ви-

хованця під нашийником не пріла. Не варто відразу купати собаку, якщо він тільки що активно бігав і грався при досить високій температурі повітря. У цьому випадку потрібно спочатку зволожити йому голову, дозволити помочити лапи, потім дати попити чистої (не з водойми) води. Нехай він трохи «охолоне», і тоді улюбленця можна відпускати купатися. Не дозволяйте хвостатому пити воду з водойми — у ній можуть бути яйця гельмінтів та збудники вірусних інфекцій, які виділяють інші тварини з екскрементами під час купання.

Особливо уважно треба слідкувати, щоби ваш улюбленець не пив воду, яка цвіте. Цвітіння вод — масовий розвиток фітопланктону, який викликає зміну кольору води і погіршує кисневу забезпеченість вод. Одна з причин цвітіння води — надходження у водойми мінеральних, особливо фосфоровмісних добрив, синтетичних засобів, органічних забруднювальних речовин. При цьому виникає замор риби, і вона гине. Якщо вживати воду з ознаками цвітіння, можуть розвинутися алергічні реакції та отруєння. Деякі види водоростей виробляють нейротоксини у великій концентрації. Це може викликати серйозні порушення роботи нервової системи.

Коли ваш вихованець занурився у воду, не дозволяйте йому пірнати. Справа в тому, що потрапляння води у вуха може стати провокуючим фактором для розвитку отиту. До речі, з цієї ж причини після купання вихованцеві слід ретельно витерти вуха рушником.

Задля уникнення переохолодження, не дозволяйте собаці перебувати у воді більше встановленого часу (15—20 хвилин). Крім того, якщо повітря прохолодне, наприклад, ввечері, то не варто чекати, коли тварина висохне самостійно, краще ретельно витерти її рушником. Якщо ж на вулиці вітер, купати собаку взагалі не варто.

Якщо ваша вихованка — дівчинка, її не рекомендується купати під час тічки, оскільки в цей період організм собаки дуже сприйнятливий до інфекцій і переохолоджень. Не варто купати й цуценя, яке ще не пройшло вакцинацію. Тільки через два тижні після всіх зроблених щеплень малюка можна порадувати водними процедурами на природі. Особливо важливо дотримуватися таких правил після щеплення від сказу, оскільки можуть виникнути деякі ускладнення — розлад травного тракту, порушення цілісності шерстного покриву тощо.

Якщо після купання собака ще довго перебував на природі, грав та бігав у піску, то краще, прийшовши додому, вимити його спеціальним шампунем. Те саме варто зробити, якщо шерсть вашого улюбленця після води має неприємний запах.

## ДЕ КУПАННЯ СОБАК ЗАБОРОНЕНО

Багато власників домашніх вихованців впевнені, що якщо в озері або річці є жаби, рибки та інша живність, то купати собаку там категорично не можна. Це помилкова думка, навпаки, якщо у воді є такі мешканці, це свідчить лише про те, що вода чиста і придатна для життя. А ось що дійсно повинно насторожити, так це велика кількість водоростей.

Не варто також купати вихованця в річках і водоймах маленьких промислових міст. До речі, якщо річка стікає у водойму, то це може означати, що в ній присутні стічні води. Категорично не можна купати собаку і в стоячих

водоймах, оскільки в такій воді розмножується велика кількість бактерій і інфекцій. І одна з найнебезпечніших для собак та людей — це лептоспіроз.

Ще одним забороненим місцем для купання собак повинні стати водойми, де живе багато водоплавної птиці, особливо в цьому відношенні небезпечні качки. Справа в тому, що в їхніх екскрементах можуть бути личинки гельмінтів, які, знаходячись на поверхні води, можуть потрапляти на шкіру вашого вихованця та викликати свербіж і занепокоєння у собаки впродовж декількох тижнів.

Багато господарів беруть своїх вихованців на море. Це допустимо, однак важливо пам'ятати, що солона вода може подразнювати шкіру собаки, тому після кожного купання важливо сполоснути її прісною водою.

## БЕЗПЕЧНЕ КУПАННЯ

Літнє купання для собаки — справжнє задоволення і прекрасний спосіб охолонути, тому, якщо поблизу немає чистого озера або річки, то на дачній ділянці можна розмістити невеличкий басейн. Однак поширена помилка дачників полягає в тому, що вони наливають у нього воду з колонки або колодязя, а потім, не дочекавшися, доки вона прогріється, занурюють туди собаку. Робити цього категорично не можна. По-перше, таке купання не завдасть вихованцеві ніякого задоволення, йому буде просто холодно. По-друге, різкий перепад температури може спровокувати збій серцевого ритму, що досить небезпечно, особливо для літніх вихованців. Крім того, стрибок температури може також спровокувати різкий спазм судин, у тому числі і мозку. І, звичайно, тварина може елементарно застудитися.

Купання має приносити собаці та його власникам тільки радість і задоволення. Сонце, блиск води, бризки і щасливий заливчастий гавкіт вихованця — ось головні атрибути цього процесу. Щоб не затьмарювати його ніяким підводним камінням в прямому і переносному сенсі, намагайтеся зробити купання собаки максимально зручним і безпечним. ■

ГРИЦЕНКО ЯНА ІВАНІВНА
ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ
ВЦ «АЛДЕН-ВЕТ»
ВУЛ. ІСААКЯНА, 1
ТЕЛ.: (044) 236-33-22

# УСТАНОВИ ПРИЛОЖЕНИЕ АЛДЕН КЛУБ!

- *экономь*
- *получай баллы*
- *заботься о своём любимце вместе с Алден-Вет*

**ИЩИТЕ «АЛДЕН КЛУБ» В:**

App Store

Play Маркет

Marketplace

Если у вас другой телефон,
перейдите с мобильного по ссылке:
**MKARTA.COM/1943**

дополнительная информация у администратора

Линия доверия «Левого берега»: (044) 227-52-97 • Линия доверия «Правого берега»: (044) 362 44 42

http://aldenvet.ua/ • Главный офис 272-07-45

# МЕРЕЖА ВЕТЕРИНАРНИХ ЦЕНТРІВ «АЛДЕН-ВЕТ»

**тел.: (044) 272-07-45 • www.aldenvet.ua**
**e-mail: aldenvet.pr@gmail.com**

Лінія довіри «Лівого берега»: (044) 227-52-97 «Правого берега»: (044) 362-44-42

| М. УНІВЕРСИТЕТ | М. ЛІВОБЕРЕЖНА | М. ХАРКІВСЬКА |
|---|---|---|
| вул. Саксаганського, 76<br>(044) 501-12-16 | вул. Серафимовича, 15а<br>(044) 500-35-35 | вул. Анни Ахматової, 16а<br>(044) 502-14-14 |
| **М. ГЕРОЇВ ДНІПРА** | **М. НИВКИ** | **М. ПОЗНЯКИ** |
| вул. Героїв Дніпра, 18<br>(044) 489-94-01 | вул. Естонська, 51<br>(044) 449-04-22 | вул. Гришка, 4а<br>(044) 575-40-16 |
| **М. ОБОЛОНЬ** | **Р-Н ВИНОГРАДАР** | **Р-Н СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ** |
| вул. Малиновського, 34<br>(044) 419-77-40 | пр-т. Георгія Гонгадзе, 20<br>(044) 463-49-39 | пр-т. Лобановського, 10<br>(044) 288-40-95 |
| **М. КПІ** | **КЛІНІКА-ПАРТНЕР** | **КЛІНІКА-ПАРТНЕР** |
| вул. Ісаакяна, 1<br>(044) 236-33-22 | вул. Драгоманова,1Д<br>(044) 390-19-40 | вул. М.Малиновського,5Б<br>(044) 337-19-73 |

# ГОТЕЛЬ
## ДЛЯ ТВАРИН

5+2 вихідні у подарунок

+

10% знижка на додаткові послуги

спеціально для користувачів додатку «ALDEN CLUB»

- безпека і піклування
- повний пансіон
- контроль комфорту
- індивідуальний підхід
- цілодобовий нагляд лікаря

• Акція діє з 1 червня 2016 року по 31 серпня 2016 року